



TRATAMENTOS PARA PSÍLIDO AFRICANO DOS CÍTRICOS

Produtos autorizados en virtude de Resolución do D.G.de Sanidade da Producción Agraria do MAPA de 9/9/2019

MATERIA ACTIVA	DOSIFICACIÓN	PRAZO DE SEGURIDADE	TIPO DE USUARIO	CONDICIONANTES
Deltametrín 1,5% EW DECIS PROTECH	0,05 % 7,5 cc / mochila de 15 li.	30 días	Autorizado a non profesionais en xardinería exterior doméstica en envases < 500 ml	
Deltametrín 2,5 % EC Varios formulados	0,03-0,05 % 4,5-7,5 cc/mochila de 15 li	30 días	Sólo usuarios con carnet de aplicador de produtos fitosanitarios.	
Aceite de parafina (CAS 8042-47-5) 54,6 % ULTRA-PROM	1-1,5 % 150-225 cc/mochila 15 li	Antes de cambio de color da froita	Autorizado a non profesionais en xardinería exterior doméstica en envases <500 ml	Non aplicar con temperaturas elevadas.
Lambda-cihalotrín 5% EG KAISO SORBIE	0,015-0,02 % 2,25 -3 cc/mochila 15 l.	7 días	Sólo usuarios con carnet de aplicador de produtos fitosanitarios.	

NOTA: Os propietarios que non teñan o carné de aplicador de fitosanitarios, deberán usar solamente produtos que estén autorizados a “non profesionais” para “xardinería exterior doméstica”, o que debe estar claramente indicado nos seus envases.

Importante: En canto se observen signos de psílido nos brotes novos, deberá aplicarse un tratamento co produto elixido, e logo un ou dous días despois, deberán recortarse todos os brotes novos e chupóns e queimalos ou enterralos; en canto volva a producirse brotación, deberá repetirse o tratamento. É ademais recomendable instalar nas árbores trampas pegaxosas amarelas para captura de adultos.