

1 PREPARACIÓN DO TERREO


- Subsulado mecanizado
- Aburatado mecanizado
- Aburatado manual (zonas de mecanización difícil)

2 PLANTACIÓN

- **Densidade de plantación inicial:** en rexenerados naturais desde 2.000-2.500 pés/ha, para monte bravo, ata 400 pés/ha, de alto fuste que acaden as cortas de rexeneración.

3 MANTEMENTOS

- Control da vexetación, ben mediante o manexo de gando ou por medios mecánicos.
- Será adecuada a apertura mecanizada de faixas rozadas de 3 m cada 25 m de anchura en montes bravos.



MODELO SILVÍCOLA QP2

ESPECIE: reboleiras de *Quercus pyrenaica* Will. como especie principal, presenza posible doutras especies en mestura, en particular carballo

OBXECTIVO: multiprodución de reboleiras en monte alto: leñas, madeira, pastoreo extensivo, aproveitamentos cinexéticos e micolóxicos

DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: todos os distritos forestais. Reboleiras de calquera calidade de estación, procedentes de rexeneración natural por rebrote ou por semente



Máis información do modelo

4 TRATAMENTOS SILVÍCOLAS

- **Resalvo de conversión:** no caso de rebrotes, primeira rarea con diámetros medios de 10-15 cm, deixando polo menos un pé por cepa. A introdución de gando permitirá reducir a intensidade do rebrote.
- **Podas de formación:** non serán, en xeral, necesarias.
- **Rareas:** 3 rareas sucesivas, polo menos, desde os 30 anos, cada 10 anos. Procurarase manter arboredo con copa ben desenvolta para evitar gromos no tronco.
- Asegurarase a conservación dos valores ecosistémicos e ambientais e da diversidade.

5 CORTAS DE REXENERACIÓN

- **Idade de corta:** aos 80-120 anos, con 400 pés/ha duns 32 cm de diámetro e altura dominante de 22-24 m.
- **Métodos de corta:** comezar aos 80-120 anos, mantendo o arboredo de maior idade sen cortar polo pé. Intervencións de rareo sucesivo buscarán a rexeneración por landra.